

平成28年 露地ナス天敵防除作業計画表

作業予定日	作業内容	注意事項
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 定植 月 日 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 定植時に、殺虫粒剤を施用。 放飼予定日の設定。 	<ul style="list-style-type: none"> 天敵の導入を予定しているほ場では、<u>合ピシ系、有機リン系、カーバメート系</u>の薬剤は使用しない。 育苗期、定植時に使用した殺虫粒剤の影響日数を確認して決定する。
↓	放飼予定日まで15日以上期間がある場合(15日未満の場合は下へ)。 (防除が必要な場合は影響日数14日以内の薬剤を選択)	
	<ul style="list-style-type: none"> 2週間前までにアザミウマ類、ハダニ類の確認。 	<ul style="list-style-type: none"> 発生が見られる場合、アファーム乳剤、コロマイト乳剤などで防除を行う。
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 放飼15日前 月 日 </div>	放飼予定日15日以内の薬剤散布は、極力控えてください。 (やむをえず防除を行う場合は影響程度◎、影響日数0日の薬剤を選択)	
↓	<ul style="list-style-type: none"> 殺菌剤で予防散布を実施 アザミウマ、コナジラミ、アブラムシが発生した場合なるべく早く防除を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤は影響程度と影響日数を確認して選択する。 例) アザミウマ類 → プレオ コナジラミ類 → ウララ、チェス アブラムシ類 → ウララ、チェス
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 天敵放飼 月 日 </div>	この期間、薬剤散布は行わない。	
↓	<ul style="list-style-type: none"> 天敵製剤は、到着後すぐに放飼が原則。 葉かき、整枝作業は控える。 	<ul style="list-style-type: none"> 天敵昆虫は原則保存できません。天候不良などによりやむを得ず保管する場合、必ず冷暗所で保管する。
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 放飼15日後 月 日 </div>	この期間の薬剤散布は、影響程度◎、影響日数0日の薬剤を選択。	
↓	<ul style="list-style-type: none"> 摘みとった葉は、ベットの^上に置いておく。 	<ul style="list-style-type: none"> 摘み取った葉は、株元の植穴にかぶらないように置くこと。 放飼1ヶ月後まで葉を持ち出さない。
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 放飼30日後 月 日 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 本葉1枚あたり1～2頭が定着のめやす。 	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤は影響程度と影響日数を確認して選択する。
定着後、天敵が十分に増えていれば、影響程度○または△の薬剤も使用できる。ただし、影響程度○または△の薬剤は連続して使用しないこと。		

平成28年 施設ナス防除作業計画表

作業予定日	作業内容	注意事項
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> 定植 月 日 </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">↓</div>	<ul style="list-style-type: none"> 定植時には、粒剤を施用。 ホリバーシートを設置する。 (10aあたり各100枚程度) 天敵を放飼の2週間前までにアザミウマ類、ハダニ類を中心に防除を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 天敵の導入を予定しているほ場では、<u>合ピシ系、有機リン系、カーバメート系</u>の殺虫剤は使用しない。 アザミウマ類 → 青色 コナジラミ類 → 黄色 アフアーム乳剤、コテツフロアブル、モスピラン水溶剤、コロマイト乳剤等 (影響日数14日以内の薬剤を選択)
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> 放飼15日前 月 日 </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">↓</div>	<div style="border: 1px solid blue; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> この期間の薬剤散布は、極力控えてください。 (やむをえず防除を行う場合は影響程度◎、影響日数0日の薬剤を選択) </div> <ul style="list-style-type: none"> 殺菌剤で予防散布を実施 アザミウマ、コナジラミ、アブラムシが発生した場合なるべく早く防除を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤は影響程度と影響日数を確認して選択する。 アザミウマ類 → プレオ コナジラミ類 → ウララ、チェス アブラムシ類 → ウララ、チェス
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> 天敵放飼 月 日 </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">↓</div>	<div style="border: 1px solid blue; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> この期間、薬剤散布は行わない。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 天敵は到着後すぐに放飼。 葉かき、整枝作業は控える。 	<ul style="list-style-type: none"> <u>天敵昆虫は保存できません。</u> 一時保管でも、必ず冷暗所で保管する。 絶対に直射日光にあてないこと。
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> 放飼15日後 月 日 </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">↓</div>	<div style="border: 1px solid blue; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> この期間の薬剤散布は、影響程度◎、影響日数0日の薬剤を選択。 </div> <ul style="list-style-type: none"> 摘みとった葉は、ベットの 上に置いておく。 	<ul style="list-style-type: none"> 摘み取った葉は、株元の植穴にかぶらないように置くこと。 5月末まで葉の持ち出しを行わない。
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> 放飼30日後 月 日 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 本葉1枚あたり1～2頭が 定着のめやす。 	<ul style="list-style-type: none"> 定着確認後は、影響程度◎および○の薬剤を選択する。
<div style="border: 1px solid blue; background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> 定着後、天敵が十分に増えていれば、影響程度○または△、の薬剤も使用できる。 ただし、影響程度○または△の薬剤は連続して使用しないこと。 </div>		